



نکات مهم در مصرف صحیح
داروهای ضد تشنج

فرم شماره ۲- آموزش به بیمار و خانواده

مراقبت های پس از ترخیص

شماره پرونده:			نام خانوادگی:
نام:	بخش: اتاق: تخت:	پزشک معالج:	نام پدر:
تاریخ تولد:	تشخیص (علت بستری):	تاریخ پذیرش:	جنس: ☐ زن ☐ مرد
بیمار محترم ضمن آرزوی سلامتی برای شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید:			
مراقبت در منزل :			
- عملکرد این داروها - جلوگیری از حملات تشنجی - چگونگی مصرف این داروها - طبق دستور دارویی مصرف شود. - بدون دستور پزشک مصرف آن ها را قطع نکنید. - علائم و نشانه های ناشی از مصرف دارو باید به پزشک یا پرستار گزارش شوند که شامل موارد ذیل می باشند - تب - گلو درد - زخم های دهانی - زود کبود شدن پوست - راش های پوستی (دانه های قرمز رنگ) - کاهش اشتها و تهوع - تاری دید - مشکل در انجام حرکات هماهنگ - سایر علائم نگران کننده - نکات خاص - این داروها می توانند باعث خواب آلودگی یا سرگیجه شوند بنابراین پس از مصرف دارو از انجام فعالیت هایی مانند رانندگی که نیاز به دقت و هوشیاری کامل دارد، خودداری کنید. - حین مصرف این داروها از نوشیدن مشروبات الکلی اجتناب کنید. - داروها را دور از دسترس کودکان قرار دهید.			